

ID \_\_\_\_\_ 患者氏名 \_\_\_\_\_ 様 (性別 \_\_\_\_\_)

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 年齢 \_\_\_\_\_ 歳 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

薬剤	投与量	投与日	
		1 コース 3 週間 Day 1.....8.....15.....22	
ナベルビン	25 mg/m <sup>2</sup>	↓	↓
トラスツズマブ	1 回目 8 mg/kg、2 回目 ~6 mg/kg	↓	

注意事項

心機能に注意 トラスツズマブ投与前には心機能を評価する (EF 50%以上)

ナベルビンはデキサート投与中に開始です。

ナベルビンは起壊死性抗がん剤です。血管外漏出に特に注意してください。血管痛に注意。

投与方法：1 日目	
1	生食 100mL メインルートをプライミングし、止める
2	生食 100 mL、デキサート(1.65mg/0.5mL) 2A 30 分かけて点滴、下の側管から投与 <b>注：次のナベルビンはこのデキサート開始 15 分後に開始</b>
3	<b>ナベルビン</b> _____ mg、生食 50 mL 全開で点滴、上の側管から投与 <b>2 のデキサート開始 15 分後に開始</b> (デキサートとナベルビンは同時投与)
4	1 の生食 100mL を使用して、ゆっくりウォッシュアウト、約 15 分、その後止める。 <b>最後のウォッシュアウトで使用するので、使い切らないこと</b>
	ソルデム 3A 200mL 30 分かけて 下の側管から投与
5	<b>トラスツズマブ</b> _____ mg、生食 250mL 下の側管から投与 トラスツズマブは注射用水で溶解：60mg/3mL、150mg/7.2mL 90 分、(問題なければ) 次は 60 分、(問題なければ) 以降 30 分、下の側管から投与 注意：点滴時間は前回投与から 8 週以上経過している時は 90 分で投与 (初回扱い)
6	1 の生食を使用し、ウォッシュアウト、ゆっくり、適宜途中終了可、残は破棄

投与方法：8 日目	
1	生食 100mL メインルートをプライミングし、止める
2	生食 100 mL、デキサート(1.65mg/0.5mL) 2A 30 分かけて点滴、下の側管から投与 <b>注：次のナベルビンはこのデキサート開始 15 分後に開始</b>
3	<b>ナベルビン</b> _____ mg、生食 50 mL 全開で点滴、上の側管から投与 <b>2 のデキサート開始 20 分後に開始</b> (デキサートとナベルビンは同時投与)
4	ソルデム 3A 200mL 30 分かけて メインルートから投与