

ID \_\_\_\_\_ 患者氏名 \_\_\_\_\_ 様 (性別 \_\_\_\_\_ )

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 年齢 \_\_\_\_\_ 歳 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

薬剤	投与量	投与日	1 コース 3 週間
		Day 1.....8.....15.....22	
ナベルビン	25 mg/m <sup>2</sup>	↓	↓

レジメンオーダー以外に必要な処方

**注意事項**

ナベルビンはデキサート投与中に開始です。

ナベルビンは起壊死性抗がん剤です。血管外漏出に特に注意してください。血管痛に注意。

投与方法：1、8日目	
1	生食 100mL メインルートをプライミングし、止める
2	生食 100 mL、デキサート(1.65mg/0.5mL) 2A 30 分かけて点滴、下の側管から投与 <b>注：次のナベルビンはこのデキサート開始 15 分後に開始</b>
3	<b>ナベルビン</b> _____ mg、生食 50 mL 全開で点滴、上の側管から投与 <b>2 のデキサート開始 15 分後に開始</b> (デキサートとナベルビンは同時投与)
4	1 のソルデム 3A 200mL を使用し、約 30 分かけて点滴 メインルートから