

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)

身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

薬剤	投与量	投与日	1 コース 1 週間
		Day 1.....8	
パクリタキセル	80 mg/m ²	↓	
トラスツズマブ	初回 4 mg/kg、2 回目～2 mg/kg	↓	

レジメンオーダー以外に必要な処方

注意事項

パクリタキセル：アルコール過敏の確認。アルコール含有のため、外来施行時、運転等での来院について確認、注意すること。
 パクリタキセルは起壊死性抗がん剤です。血管外漏出に特に注意してください。

パクリタキセル初回および4週以上あいた時：心電図モニター、BP、HR測定、全身状態の観察が必要（詳細は下記参照）

心機能に注意 トラスツズマブ投与前には心機能を評価する（EF 50%以上）

投与方法：1日目	
1	専用のフィルター付き点滴セットを使用 生食 100mL メインルートをプライミングし、止める
2	デキサート(1.65mg/0.5mL) 4A、ファモチジン(20mg/20mL) 1A、 生食 30 mL 15分かけて点滴 下の側管から投与
2	ポララミン (5mg/1mL) 1A、生食 50 mL 15分かけて点滴 下の側管から投与
3	パクリタキセル _____ mg 、5%ブドウ糖 250 mL 60分かけて点滴 上の側管から投与 初回および4週以上あいた時、下記を実施 心電図モニター 投与前、5分後、15分後、30分後、終了時後：BP、HR測定 投与前、5分後、15分後、30分後、終了時後：全身状態の確認（呼吸苦、悪寒、発疹、搔痒感、気分不良、嘔気）
4	1の生食 100mLを使用して、ゆっくりウォッシュアウト、約15分、その後止める。 最後のウォッシュアウトで使用するので、使い切らないこと
5	トラスツズマブ _____ mg 、生食 250mL トラスツズマブは注射用水で溶解：60mg/3mL、150mg/7.2mL 90分、（問題なければ）次は60分、（問題なければ）以降30分、下の側管から投与 注意：点滴時間は前回投与から8週以上経過している時は90分で投与（初回扱い）
6	1の生食を使用し、ウォッシュアウト ゆっくり、適宜途中終了可、残は破棄可