

# レジメン名称: パクリタキセル単独(毎週\_weekly)

乳癌

ID \_\_\_\_\_ 患者氏名 \_\_\_\_\_ 様 (性別 \_\_\_\_\_)

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 年齢 \_\_\_\_\_ 歳 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

薬剤	投与量	投与日	1 コース 1 週間
パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	Day 1.....8	
		↓	

レジメンオーダー以外に必要な処方

パクリタキセル投与日: レスタミン 5錠 1× 化学療法時 1回分

## 注意事項

パクリタキセル: アルコール過敏の確認。アルコール含有のため、外来施行時、運転等での来院について確認、注意すること。

パクリタキセルは起壊死性抗がん剤です。血管外漏出に特に注意してください。

パクリタキセル初回および4週以上あいた時: 心電図モニター、BP、HR測定、全身状態の観察が必要(詳細は下記参照)

投与方法: 1日目	
1	生食 100mL (専用フィルター付き輸液セット使用) メインルートをプライミングし、止める
2	レスタミン(10mg) 5錠 内服
3	デキサート(1.65mg/0.5mL) 5A、ファモチジン(20mg/20mL) 1A、 <span style="border: 1px solid black;">生食 30 mL</span> 5分以上かけて点滴、下の側管から投与
4	グラニセトロン(3mg/100mL) 1V 30分かけて点滴、下の側管から投与
5	<b>パクリタキセル _____ mg</b> 、生食 250 mL 60分かけて、上の側管から投与 <span style="border: 1px solid black;">初回および4週以上あいた時、下記を実施</span> <span style="border: 1px solid black;">心電図モニター</span> <span style="border: 1px solid black;">投与前、5分後、15分後、30分後、終了時後: BP、HR測定</span> <span style="border: 1px solid black;">投与前、5分後、15分後、30分後、終了時後: 全身状態の確認(呼吸苦、悪寒、発疹、掻痒感、気分不良、嘔気)</span>
6	1の生食を使用し、ウォッシュアウト ゆっくり、適宜途中終了可、残は破棄