

# レジメン名称: ハラヴェン + トラスツズマブ

乳癌

ID \_\_\_\_\_ 患者氏名 \_\_\_\_\_ 様 (性別 \_\_\_\_\_)

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 年齢 \_\_\_\_\_ 歳 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

薬剤	投与量	投与日	
		1 コース 3 週間 Day 1.....8.....15.....22	
ハラヴェン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	↓	↓
トラスツズマブ	1 回目 8 mg/kg、2 回目 ~6 mg/kg	↓	

必要に応じて下記処方をご検討下さい

しびれ：牛車腎気丸 3P 3×食前、筋肉痛：芍薬甘草湯 3P 3×食前

## 注意事項

ハラヴェン：1 バイアルあたり 0.1mL の無水エタノールが含まれます

**心機能に注意 トラスツズマブ投与前には心機能を評価する (EF 50%以上)**

投与方法：1 日目	
1	生食 100mL メインルートをプライミングし、止める
2	グラニセトロン(3mg/100mL) 1V、デキサート(1.65 mg/0.5 mL) 2A 30 分かけて点滴、下の側管から投与
3	<u>ハラヴェン</u> _____ mg、生食 50 mL 全開で点滴、上の側管から投与
4	1 の生食 100mL を使用して、ゆっくりウォッシュアウト、約 15 分、その後止める。 <b>最後のウォッシュアウトで使用するの、使い切らないこと</b>
5	<u>トラスツズマブ</u> _____ mg、生食 250mL トラスツズマブは注射用水で溶解：60mg/3mL、150mg/7.2mL 90 分、(問題なければ) 次は 60 分、(問題なければ) 以降 30 分、下の側管から投与 注意：点滴時間は前回投与から 8 週以上経過している時は 90 分で投与 (初回扱い)
6	1 の生食を使用し、ウォッシュアウト 適宜途中終了可、残は破棄

投与方法：8 日目	
1	生食 100mL メインルートをプライミングし、止める
2	グラニセトロン(3mg/100mL) 1V、デキサート(1.65 mg/0.5 mL) 2A 30 分かけて点滴、下の側管から投与
3	<u>ハラヴェン</u> _____ mg、生食 50 mL 全開で点滴、上の側管から投与
4	1 の生食を使用し、ウォッシュアウト 適宜途中終了可、残は破棄