

レジメン名称:テモダール内服(d1-5)+アバスチン(d1,15)_q4w 悪性神経膠腫

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)

身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

薬剤	投与量	投与日	
		1 コース 4 週間 Day 1.....8.....15.....22.....29	
アバスチン	10 mg/kg	↓	↓
ナゼア OD	1 錠 1 日 1 回 夕食後	↓↓↓↓↓	day 1~5
テモダール	150~200 mg/m ² /回 1 日 1 回 寝る前 (通常初回 150 mg/m ² 、 2 回目以降 200 mg/m ² へ増量可)	↓↓↓↓↓	day 1~5

レジメンオーダー以外に必要な処方

Day1~:ナゼア 0.1 1T 1×夕食後、5 日間内服

Day1~:テモダール 1×寝る前、5 日間内服

投与方法 : 1、15 日目	
1	(ケモセーフ不要) 生食 100mL メインルートをプライミングし、止める
2	<u>アバスチン</u> _____ mg, 生食 100mL 90 分, (問題なければ) 次は 60 分, (問題なければ) 以降 30 分、側管から投与 注意 : 点滴時間は前回投与から 8 週以上経過している時は 90 分で投与 (初回扱い)
3	1 の生食を使用し、ウォッシュアウト ゆっくり、適宜途中終了可、残は破棄