

ID _____ 患者氏名 _____ 様 (性別 _____)

身長 _____ cm 体重 _____ kg 年齢 _____ 歳 体表面積 _____ m²

薬剤	投与量	投与日
		1 コース 2 週間 Day 1 2 3 …… 8 …… 15
オキサリプラチン	85 mg/m ²	↓
イリノテカン	180 mg/m ²	↓
レボホリナート	200 mg/m ²	↓
フルオロウラシル bolus	400 mg/m ²	↓
フルオロウラシル持続	2400 mg/m ²	↓ 1 日目から 46 時間持続投与
アロキシ 1V、デキサート(1.65)4A		↓
デカドロン(0.5)内服	8~16 錠 1×朝	× ↓ ↓ 2,3 日目に内服
アプレピタント(内服)		↓ ↓ ↓ 1 日目 : 1 カプセル(125)レジメン通りに、2,3 日目 : 1 カプセル(80) 1×朝食後

レジメンオーダ以外に必要な処方

Day1~:アプレピタントセット 1 シート、1×朝食後、1 日目はレジメン通りに

Day2, 3 : 内服 デカドロン 4~8mg 1×朝食後 2 日分

注意事項

イリノテカンはレボホリナート開始 30 分後に開始です

投与方法 : 1 日目~	
1	内服 アプレピタント(125) 1C 点滴開始 30 分前に内服
2	アプレピタント内服 30 分後より開始 生食 100mL、メインルートをプライミングし、止める
3	アロキシ 1V、デキサート (1.65mg/0.5mL) 4A、生食 100 mL 30 分かけて点滴、下の側管から投与
4	オキサリプラチン _____ mg, 5%ブドウ糖 250mL (必ず 5%ブドウ糖で) 120 分かけて点滴、上の側管から投与
5	レボホリナート _____ mg, 生食 500mL 120 分かけて点滴、下の側管から投与
6	次のイリノテカンはレボホリナート開始 30 分後に開始 イリノテカン _____ mg, 生食 250mL レボホリナート開始 30 分後に開始 90 分かけて点滴、上の側管から投与
7	フルオロウラシル _____ mg, 生食 40mL 全開で投与、上の側管から投与
8	1 の生食を使用し、ウォッシュアウト、ゆっくり、適宜途中終了可、残は破棄
9	フルオロウラシル _____ mg, 生食、 全量 230mL 5 mL/時、46 時間かけて、ケモセーフセットを外して、インフューザーポンプにて投与

投与方法 : 2, 3 日目	
1	内服 アプレピタント(80) 1C 1×朝食後、デカドロン(0.5) 8~16 錠 1×朝食後